

Коронавирус. Что надо знать

Вирус передается воздушно-капельным путем

Коронавирус - возбудитель ОРВИ, при которой отмечается ярко выраженная интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами

Симптомы

Обильные выделения из носа водянистого характера

Заложенность носа

Чихание, покашливания

Озноб, чувство ломоты в конечностях

Белый налет на языке

Болезненность в горле

Слабость, бледность кожи

Умеренное повышение температуры тела

Осложнения

Менингоэнцефалит

Отит

Пневмония

Синусит

Миокардит

У детей могут отмечаться проблемы с ЖКТ

Как снизить риск заражения

Мойте руки не менее 20 секунд

Не касайтесь глаз, носа или рта немытыми руками

Избегайте тесного контакта с людьми, которые кашляют и чихают

Используйте маску, меняйте ее каждые 2 часа

КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ COVID-19

острая респираторная инфекция, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2.

Симптомы:

повышение температуры

головная боль

сухой кашель

общая слабость

боли в грудной клетке

боли в мышцах

Пути передачи:

воздушно-капельный (при кашле, чихании, разговоре)

воздушно-пылевой (с пылевыми частицами в воздухе)

контактно-бытовой (через рукопожатия, предметы обихода)

Меры профилактики

чаще мойте руки с мылом

ограничьте путешествия

носите защитные маски

избегайте людных мест

соблюдайте дистанцию

немедленно обращайтесь к специалистам при появлении болезни

Коронавирус. Симптомы и меры предосторожности

Коронавирус — возбудитель острой респираторной вирусной инфекции. Передается воздушно-капельным путем, от человека к человеку. При заражении у больного начинаются проблемы с дыханием и пищеварением.


Симптомы



Осложнения



Как уберечься от вируса




ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Коронавирусная инфекция. Что надо знать

- Коронавирусы – острое вирусное заболевание, при котором отмечается ярко выраженная интоксикация организма с преимущественным поражением дыхательной системы
- Резервуар и источник инфекции: больной человек или животное
- Механизм передачи: воздушно-капельный (выделение вируса при кашле, чихании, разговоре), контактный и фекально-оральный.
- Инкубационный период: от 2 до 14 суток, чаще 2-7 суток
- Период заразности: весь инкубационный период, в том числе при отсутствии симптомов

Симптомы

Головная боль
Повышение температуры тела
Кашель
Заложенность носа
Озноб, ломота в теле



Осложнения

Менингоэнцефалит
Пневмония
Миокардит
Отит
Синусит

Как снизить риск заражения –

- Мойте руки перед едой и после посещения людных мест
- Избегайте тесного контакта с людьми, которые кашляют и чихают
- Уточняйте эпидемиологическую обстановку при планировании путешествия

При первых симптомах заболевания, срочно обращайтесь к врачу

